

## Slangen

Bali staat bekend als het eiland van de 1000 goden, maar toch zullen die niet helpen als je plotseling oog in oog staat met een slang. Van de tientallen soorten slangen op Bali zijn er maar 6 die giftig zijn. In het algemeen zijn slangen zeer schuw en zullen ze er alles aan doen om contact te vermijden. Ze zijn niet snel agressief, tenzij ze worden bedreigd. De slangen op Bali die giftig zijn produceren geen dodelijke gif, maar neurotoxine, dat betekent dat hun gif verlamming veroorzaakt.

### **Behandeling van een slangenbeet:**

Probeer te onthouden wat voor soort slang gebeten heeft, dat is zeer belangrijk voor de behandeling van de beet.

Laat vooral de beet vrij bloeden gedurende ongeveer een minuut. Hierdoor kan het lichaam op natuurlijke wijze het gif verdrijven.

Reinig de beet met water en vervolgens met een desinfecterend middel zoals Betadine. Als de beet onder de knie is, wikkel een bandage rond de knie of daarboven. Als het onder de elleboog is wikkel een bandage rond de elleboog of er net boven. Doe het niet te strak - het is belangrijk om de bloed toevoer niet af te snijden.

Als u niet over een verband beschikt gebruik dan een sarong, T-shirt, sjaal of handdoek.

Gebruik een spalk om bewegen van het been of de arm die is gebeten te voorkomen.

Probeer het gebeten lichaamsdeel op de dezelfde hoogte te houden als het hart. Als het te hoog ligt stroomt er meer gif naar het hart, te laag betekend dat de gewonde ledematen beginnen op te zwellen.

Breng het slachtoffer onmiddellijk naar het Sanglah ziekenhuis in Denpasar, het enige ziekenhuis met faciliteiten tegen slangenbeten. Wacht niet op een ambulance - bel het ziekenhuis onderweg en laat ze weten dat je komt met een slangenbeet.

Als een spugende cobra gif spuit in iemands ogen onmiddellijk reinigen met koud stromend water. Als water niet beschikbaar is gebruik dan melk of urine.

## Giftige slangen

### **King Cobra (Ular Raya)**



De King Cobra is een van de meest giftige slangen op Bali. Deze slang kan wel 6 meter lang worden. Hij is bruin van kleur en heeft een karakteristieke kop die omhoog komt wanneer het wordt bedreigd. Door de grootte van de slang en de grootte van de bek wordt ongeveer 80% van zijn gif afgegeven tijdens de beet. Meer dan de helft van deze beten zijn fataal wanneer zij niet behandeld worden. De symptomen verschijnen ongeveer 15-30 minuten na de beet en omvatten duizeligheid, ademhalingsproblemen, pijn rond de beet en hangende oogleden.

### Malayan Krait (Ular Katang Tebu)



Dit is een van de meest giftige slangen in Bali, maar deze is erg schuw en is het onwaarschijnlijk dat hij zal bijten, tenzij het voortdurend wordt getreiterd. Het is een glanzend zwarte slang die kan uitgroeien tot anderhalf meter. Soms is de slang zwart met afwisselend zwarte en witte banden rond de hele lengte van zijn lichaam. De buik van de slang onder is crème-kleurig of een vuile witte kleur. De beet veroorzaakt bijna geen pijn of zwelling, maar is dodelijk als de beet niet wordt behandeld.

### Javan Spitting Cobra (Ular Sendok)



De Spitting Cobra is gerelateerd aan de King Cobra hoewel iets kleiner. Het is meestal bruin/zwart van kleur maar kan ook licht bruin of lichtbeige zijn. Ze spugen meestal gif in de ogen van een aanvaller als ze bedreigt worden, waardoor tijdelijke blindheid en extreme pijn wordt veroorzaakt. Daarnaast kan het gif leiden tot het afsterven van weefsel rond de plaats van de beet.

### Oriental Whip Snake of Asian Vine Snake (Ular Pucuk)



Deze lange dunne slang varieert in kleur van helder groen tot licht bruin, soms groen met witte stippen. Het heeft gele tekening rond zijn ogen. Hij wordt vaak verward met de meer gevaarlijke Green Pit Viper, maar zijn lichaam is lang en dun, en de kop is langwerpig in plaats van pijlvormig. Er kan een dunne bleke lijn langs de lengte van het lichaam lopen. Hij kan vrij lang worden (tot 2 meter) en leeft graag in bomen. Hij is erg schuw en het is onwaarschijnlijk dat hij zal aanvallen – als dat zo is dan is het in de meeste gevallen alleen een lokale zwelling en veel pijn.

### Green Pit Viper (Ular Hijau)



Meestal te vinden in bomen en struiken zal deze slang je snel aanvallen na slechts een kleine provocatie. Hij heeft een brede driehoekige kop met warmte-sensoren 'pits' aan beide zijden die hij gebruikt bij het jagen, en een rode of roze gekleurde staart. De slang is relatief kort, niet meer dan een meter en heeft een tamelijk dik lichaam. De kop wordt gescheiden van het lichaam door een smalle hals. De symptomen zijn hoofdpijn, misselijkheid, stuipen, diarree en duizeligheid. Het gif veroorzaakt overmatig bloeden of overmatige bloedstolling. Zonder behandeling overlijdt 1-10% van de slachtoffers. Er is geen antiviral beschikbaar in Bali voor deze slang, maar met een snelle behandeling is de beet zelden dodelijk.

### ZeeSlangen (Ular Laut)

Er zijn twee soorten zeeslangen in Bali - de gewone zeeslang en de gestreepte zeeslang



met gekleurde banden over de hele lengte van zijn lichaam. Deze slang is giftig, maar vanwege de positie van de tanden is het onwaarschijnlijk dat het ernstig letsel veroorzaakt. Maar zoals bij elke beet van een slang moet deze worden beschouwd als ernstig en onmiddellijk behandeld worden in het ziekenhuis.

Slangen zijn banger dan mensen, de kans dat je er een tegenkomt is minimaal!

### Klabang



Een ander dier waar je een beetje voorzichtig mee moet zijn is de Klabang. Een soort duizendpoot van ongeveer 2 centimeter lang. Niets bijzonders maar de beet kan vervelende gevolgen hebben, je kunt er zwaar ziek van worden.

## Schorpioenen



Schorpioenen zijn erg klein hier en hun steek is meer als een bijensteek. Tenzij je allergisch bent is er niets aan de hand. Een plek waar je ze tegen kunt komen is tussen stenen, op de muur van de buitendouches en tussen je gevouwen was.